Bind with (covers)

H

V. 1

外臺秘要

[illegible]

" " " "

Copy of an ancient (A.D. 320) Chinese work on medicine

Shanghai

1922

In sixteen volumes.

Vol. I.

Presented by Dr. Casey Wood
Hongkong, Sept. 27. 26

Page 1

唐王壽先生
外臺秘要

民國四年上海
鴻寶書局石印

序

天下事久壞於庸人而庸醫均之所謂庸者皆不學無術之人也其遇事也初不晰其受病之源并不審其對治之方而或以姑息養癰或以鹵莽嘗試究之鹵莽之爲害什居五而姑息之爲害什居八迺始藉手以貽後人曰吾姑徐徐無動爲大耳不知邪氣日深元氣日削而大命已隨之所謂庸臣誤國與庸醫誤人其情同其罪均而其原皆本於不學使其學之而窮究古今之病源細考古今之方略其病之在標在本也其方之宜補宜洩也其病之或傳或變也其方之不執不拘也彼夫三年蓄艾能治之於未病之先與夫一匕回生能治之於已病之後皆是先聖先賢當日殫竭之心思皆是醫國醫人當日素具之方略儒者明理奈何不亟亟講求而以人命爲戲耶此余友敬通氏探析性命之微雅抱痌瘝之痛而以好學不倦之旨牖人以博施濟眾之方先梓外臺秘要續補聖濟總錄壽國壽民具茲編矣程子之功顧不偉歟時

崇禎庚辰清和之吉

賜進士及第翰林院編修　國史　講官邑人吳孔嘉撰

序

程敬通氏名儒也語輒破的以文雄兩浙間亦名醫也所活無算都人士走其門如騖敬通氏亦挾刀圭而走四方以日出治醫日晡治儒出門治醫入門治儒下車治醫上車治儒分身以應猶不勝其勞憊而乃謀之余不佞不佞曰子儒者余請以儒言醫宣尼有言博施濟衆不如為仁之方方術也醫方仁術也以身生人與以言生人其仁孰廣其為仁孰約子試辨之敬通氏乃窮寒暑日夜之力購集唐王燾外臺秘要四十卷為方六千九百有奇纏分嚴訂以付剞劂夫敬通氏斷葷少欲雖不佞佛實大得西來意故其言曰醫有秘要猶佛有秘密藏也大醫王隨病發藥集經五千四十八卷開示衆生衆生之學其道者認賊作子不得因賊棄子不得指標為月不得指月廢標亦不得若夫醫之有方正類兵法之有孫吳穰苴離則為野戰執則又為馬服子之讀父書神而明之存乎其人變而通之存乎其心譬之維摩詰嘿然無語三十二義一時俱墮語不能顯嘿不能藏雖非秘猶秘也旨哉陸井翁之以易詮醫也其理乎易其用變易其方又不易明乎易而青囊之訣思過半矣昔長桑君禁方非秦越人不傳今敬通氏尊王司馬為長桑君而以己當秦越人千年舊本稍經參駁便足禆軒岐而繹四氏一旦起而醫國膏肓腠理洞若觀火行使六合之大運於十指萬姓之命起於一匙凡枕中秘藝當與鴻寶金匱並傳兩者甯出唐王司馬下哉

賜進士第中議大夫贊治尹奉
勅巡撫湖廣等處地方提督軍務都察院右僉都御史前太常寺少卿
欽差督催湖廣餉務吏部驗封清吏司郎中文選考功清吏司員外郎典陝西試事里人唐暉譔

自序

蓋聞上古之世方不如醫中古之世醫不如方甚矣醫與方之並重也世降而方愈淩雜莫不各據一家
言彼此互相是非間有二三驗方亦惟是父師傳之子弟絕不輕以示人而其鐫行於世者率皆依樣葫
蘆時或改頭換面以博名高則已矣余獨取外臺祕要付之剞劂者何請得而備言之蓋自神農氏深明
藥性著本草經三卷而未有方也軒轅氏日與岐伯雷公剖析病機著素問靈樞經各九卷而未有方也
商周之間如伊尹如和如緩如跗皆以醫名而未有方也越人受長桑君之禁方所傳於世者八十一難
經及治虢太子尸厥耳而其為帶下醫小兒醫耳目痺醫俱未悉其所以為方也倉公受公乘陽慶之禁
方所可曉者莨菪子湯苦參湯耳其他火齊湯下氣湯陽劑剛石陰劑柔石亦未悉其所以為方也若夫
刳腸湔胃無論其方不傳即令華元化方傳至今而亦難乎傚其為方也惟是仲景氏出有卒病論以治
傷寒著方一百一十三有金匱要略以治雜病著方一百一十二醫方實開先焉蓋鼻祖也又得叔和王
氏為之詮次俾仲景之微旨益以彰明叔和氏不更立方即述仲景之方為方者也皇甫士安之甲乙經
特重鍼刺而無方巢元方之病源每病必有源源必立論而無方覽者咸以無方致憾迨唐有孫真人者
初著方三十卷晚復增三十卷自珍其方曰千金醫方較明備焉蓋大宗也乃前後乎孫真人者人則有
深師崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇若而人方則有廣濟錄驗刪繁肘後延年小品必效若
而方門分派別編帙浩繁從未有綜而輯之者獨刺史王燾先生前居館閣二十年採摭羣書彙成方略
上遡炎昊下及諸家傷寒壹遵仲景發論率冠病源雖置鍼法不言而大唐以前之方靡有遺佚千金則
居多焉卷凡四十方餘六千蓋集醫方之大成者題曰祕要悉皆祕密樞要也自宋皇祐詔諭刊布後無
復鋟梓以廣其傳豈非沿習時尚而探源證本者之寡其儔哉夫天下何事不宜師古文則六經之外必
追秦漢字則篆籀而後必法鍾王至於醫而何獨不然昔祖訥云辨釋經典小有異同不足以傷風教湯
藥小小不達則後人受弊不淺此余亟欲以外臺祕要公諸海內之深意也向購寫本訛缺頗多因復殫

力校讐遇有疑義則旁引類證錄於篇側其無文可徵者不敢强釋以俟解人十載始竣厥工客閱而謂余曰奧義之難析也圓机之莫辨也淺識可以漫試乎余曰用其所信闕其所疑可也又謂世代之推遷也風氣之殊尚也陳轍可以適時乎余曰不師其法而師其意可也且謂同病而異方也同方而異治也毫釐不幾千里乎余曰三部微妙別之在指五藏精華察之在目合色脉而後定方求其曲當可也總之以方為方方遂一成而不易以矩為方方乃萬變而不窮誠究心於平昔會其所以立方之意斟酌於臨時施其確然對證之方果屬熱而當寒何不參之河間濕而宜燥何不參之東垣可汗可吐而可下何不參之子和陰陽乖錯榮衛失調何不參之丹溪博洽前方勿執我見期於實有拯救不愧前賢濟民利物之心則請以外臺秘要一書為醫家之筌蹄也亦奚不可新安後學程衍道敬通父謹識

序

論周官者曰先王於民物皆有醫而不及王后世子公卿大夫則何也曰萬民之疾治於已然自王而下力足致醫唯是編户商民不幸有風霜雨雪之感力難自醫是烏可以無備梁陶景序肘後百一方亦云夫生民之所大患莫急乎疾疢疾疢而不治猶救火而不以水也今夫師藥之值郊郭已希況窮村迥陌遥山絶浦其間夭枉焉可勝言葛氏自謂其書可以施於貧家野居然而搢紳君子或從祿外邑將命遠途或祗值禁闈或羈束戎陣驚急倉卒唯闇拱手孰若探之枕笥而隨在醫師若夫虞摯之詠疾愈則曰講和緩之餘論尋越人之遺方考異同以求中稽衆術以簡良嵇紹之賦寒食散則又曰爾乃酌醴操散商量部分進不妨舊旁無顧問偉斯藥之通神建殊功於今世夫疾不愈於無方而一散著夫神績洵陳孝廉不就袁太尉之辟而其精於方藥至心識分銖不假稱量蓋凝玄契之有不可告語人者新安地多高士每一營精必求其傳如程君衍道者以良醫之心代良宰相其夙願已丙子客過栽籍籍頌之適季弟病脾爰命偕客以一葦遥訪不意下榻信宿遂霍於一匕想董蘇門牆亦無多讓適其心尤以之下事半覆於庸人而疾疢為最期復見巫岐面目使人得以盡年姑以王司事祕要方為振領刻而布之海內今天下事事待疏瀹事事待補救伊者作方書有熊究息脈陶唐用之以平洚水有虞用之以殄凶人卻濁除毒其義一也刻成而拉余言弁其首余無暇盡讀祕要程君刻祕要之意則余得而明之況乎治已然與治未然凡抱尊體而重民命之意者又烏可不相與以講求之哉

東閣大學士禮部尚書方逢年撰

語有之運千刃者可以發硎操千曲者可以聽聲醫亦云然上古之世方不如醫中古之世醫不如方世愈降而方愈繁方者防也防於未然驗於已試譬之輪輳輻轂合軸而致遠檣帆樓櫓合楫而乘風醫不習方與瞽趨冥蹈等昔者宓犧畫卦炎農嘗草本造化以開人事而吉凶悔吝宰命造物率繇之五運六氣非即陰陽順逆之指乎五味五色非即水火風雷之辨乎君臣佐使非即君一民二之徵乎牛溲馬渤非即雞豕犬羊之象乎喜忌溫涼非即損益剝復之義乎繫辭所謂危者使平易者使傾思過半矣聖人之心無非易聖人之易無非醫神而守之變而通之日乾夕惕而時保之則又宣尼無過之旨有恆之占也聖王惟以易觀醫故不規術而規道軒轅素問先彖象以闡微周官政令掌之醫師隸之冢宰天道好生醫道承天謹人事以體天道綦重矣術云乎哉自太史公斥為不祥九流置之然而周之矯之俞之盧秦之和之緩宋之文摰鄭之扁鵲漢之樓護陽慶倉公其人九京其方千古存什一於千百後世率遵塗而闕徑焉垂之天寶王司馬燾有外臺祕要方四十卷縷析條分採摭幾備沿及政和有聖濟總錄二伯卷迄元大德重加訂梓金匱玉版之藏桐君雷公之祕已無遺義夫以哲后鉅卿修舉靡閒爰注精一已寸指之未何哉要亦承天規道之極思而德洽好生仁壽一世雖和緩倉扁復起吾知不能出大宗而外象帝矣惜貯之內府不落人間新安程生衍道購得家藏善本輒閉戶却軌皈禮藥王矢願訂讐不計歲月且謀棗梨以公海內而力有未逮請先從王司馬祕方始粵稽司馬有至性嘗藥事毋窮究方冊薈萃成編今程生名籍藝林腹笥經庫不啻龍挫萬象旁燭眾有凡所拯療直可却二豎識分銖猶復研究不遺則又仁孝深情甯止為道術分解也程伊川曰事親者不可不知醫不佞亦云善醫者不可不攷方敬諾程生之請為前導

賜進士出身中憲大夫江西等處提刑按察司副使奉

勅提督學政當湖陸錫明序

序

嘗謂良醫與良相功齊揔之能為民生造命耳予武夫也不知相亦不知醫惟是人之有疾不啻己出值此滄桑變故之際民遭兵火若患熱烈之證予濫任撫綏尤當視民如傷恨不能人人而投以清涼之劑自入新安以來每問民間疾苦見程生行道者業儒而通醫博施濟衆久矣更搆唐時王刺史外臺祕要四十卷詳訂而剞劂之蓋醫之有方猶兵之有法也說者曰功在一隅者小而功在四海者大又曰功在一時者小而功在千古者大是程生傳流方略意也若然則程生志在要功矣而非也程生恐匹夫匹婦疾病而無告又恐良醫良相世代不全有不能弭病於無病之先尚可瘳病於有病之後繼宋而鐫壽民因以壽國大有深心文王畫卦使人知吉凶孔子作春秋使人知君臣即此意也程生一士子藉醫而行相道然與予撫民一念默相脗合又以醫而兼將矣曷可與庸人道也天下後世能按此而擴充之又何病民之與有

欽命提督徽甯池太等處地方總兵官都督同知榆林張天祿題

序

程子敬通醇儒也而旁通於醫吾於醫固未之學而一接程子指脈說病則目無全人微言高論疊見層生聞未聞解未解程子之於醫幾乎道又見其醫人也雖極賤貧但一接手則必端問詳審反覆精思未嘗有厭怠之色其疑難者多至盈時惟恐少誤無惑而後動其心行復如是是其人一第而為宰官推是道也用是心也以往其謀國以善萬里生民之寄豈可及哉有唐王刺史外臺秘要一書更五代至宋孫中丞一較正行之及今而絕程子不忍圖令其流布人間而為余言余因問程子如欲知醫何道而能精曰必好學將何學曰先讀書讀書可以醫乎曰讀書而不能醫者有之矣決未有不讀書而能醫者也嗚呼天下事皆然耳獨醫也乎余因問程子以子之道醫世之人當吾世而既日不暇給及身後而書不盡言言不盡意吾懼其不傳也盍得其人而傳之何以書程子曰師之求弟甚於弟之求師有來學者吾願盡所學焉爾而無如今之來學者未嘗求學徒以求行也是道也非苦心十年不可得而今之學者來輒問曰欲就師授十日足乎一若是其亟也吾雖欲傳其何從而傳嗚呼天下之學大抵然耳獨醫也乎古之君子其於道也其始也急求人而已及其求人不可得則不得不有事於書以冀其長存天地之間其於書也不必自著書而章隱繼絕圖存古人之書古人之書其賴有心之後人以獲行世者多矣初不必後人之盡有心盡好學而能讀也而其書則不忍以不存以為萬有一人焉有心好學而一能讀是書也則是一書為遂不虛存也更百世而當有人焉出而視今日之敬通程子亦猶程子之視唐宋王刺史孫中丞而先生也則今日之及程子之門而欲以十日盡學其所學者程子其亦可以謝之而無所負矣

賜進士出身翰林院庶吉士奉
命參佐軍務
欽授山東道監察御史郡人金聲撰

序

余沐休林下習程公敬通公之里先有玠公者成進士于軒岐之術靡不精公尤博學補諸生以餘閒從事于養生家言遂抉其奧得禁方參伍而用之活人甚眾業擅一時四方造廬而請者車塡咽門公以次按行東之西怨南之北怨病者望之如望歲焉間與余論方技言人秉陰陽既薄蝕于寒暑風霾又侵奪于饑飽嗜慾復戕伐于喜怒女謁身非木石何得不病巨室力易于致醫若夫窶人繩樞之子與逆旅遷客于幸惹恙于時倉皇則簡之笥中而醫師自足是方書重矣外臺祕要已驗之良法不下于肘後百一欲廣布之海內藉余弁首而行余謂病之需良醫猶治之待良相美哉越人之言曰上醫醫國其次醫家其次醫身夫和靜則壽域戾擾則亡徵藥有養命者有養性者察其虛實審其寒熱時其補洩能防于未然導養得理性命自盡何夭枉之有觀于身而知國未有不均于哲士而僨于庸人者公妙于上池而推重司馬之書因知祕要蓋方略之善者也推端見委證治較然卓越羣識與素問靈樞合轍推公之志欲使人人得以盡年其仁心為質乎雖然神而明之存乎其人有不泥于祕要也者斯善讀祕要者也

賜進士第正議大夫太常寺卿吳士奇譔

序

夫外臺者刺史之任也祕要者祕密樞要之謂也唐王燾臺閣二十餘年久知弘文館得古今方上自神農下及唐世無不採摭集成經方四十卷皆諸方祕密樞要也以出守于外故號曰外臺祕要方凡一千一百單四門以巢氏病源諸家論辨各冠其篇首一家之學不爲不詳王氏爲儒者醫道雖未及孫思邈然而採取諸家之方頗得其要者亦崔氏孟詵之流也且古之如張仲景集驗小品方最爲名家今多亡逸雖載諸方中亦不能別白王氏編次各題名號使後之學者皆知所出此其所長也又謂鍼能殺生人不能起死人其法云亡且久故取灸而不取鍼亦醫家之蔽也此方撰集之時或得缺落之書因其闕文義理不完者多矣又自唐歷五代傳寫其本訛舛尤甚雖鴻都祕府亦無善本國家詔儒臣較正醫書臣承命以其書方證之重者删去以從其簡經書之異者註解以著其詳魯魚豕亥煥然明白臣謂三代而下文物之盛者必曰西漢止以侍醫李柱國較方技亦未嘗命儒臣也臣雖濫吹儒學但盡所聞見以脩正之有所闕疑以待來哲總四十卷并目錄一卷恭惟　主上盛德承統深仁流化頒此方論惠及區宇贊天地之生育正萬物之性命使歲無疵癘人不夭橫熙熙然歌樂於聖遠者也前將仕郎守殿中丞同較正醫書臣孫兆謹上

序

宋皇祐三年五月二十六日

內降劄子臣寮上言臣昨南方州軍連年疾疫瘴癘其尤甚處一州有死十餘萬人此雖天令差舛致此札瘥亦緣醫工謬妄就增其疾臣細曾詢問諸州皆闕醫書習讀除素問病源外餘皆傳習僞書舛本故所學淺俚詿誤病者欲望

聖慈特出秘閣所藏醫書委官選取要用者較定一本降付杭州開板模印庶使

聖澤及於幽隱民生免於夭橫奉

聖旨宜令逐路轉運司指揮轄下州府軍監如有疾疫瘴癘之處於聖惠方內寫錄合用藥方出榜曉示及遍下諸縣許人抄劄仍令秘閣簡外臺秘要三兩本送國子監見較勘醫書官子細較勘聞奏劄付孫兆准此至治平二年二月二日准中書劄子較正醫書所狀醫書內有外臺秘要一項今訪聞前較正官孫兆較對已成所有淨草見在本家欲乞指揮下本家取赴本局脩寫進冊所貴早得了當候指揮奉

聖旨依所申施行至四年三月　日

進呈訖

序

昔者農皇之治天下也嘗百藥立九候以正陰陽之變診以救性命之昏札俾厥土宇用能康甯廣矣哉洎周之王亦有冢卿格于醫道掌其政令聚毒藥以供其事焉歲終稽考而制其食十全為上失四下之我國家率由茲典動取厥中置醫學頒良方亦所以極元氣之和也夫聖人之德又何以加于此乎故三代常道百王不易又所從來者遠矣自雷岐倉緩之作彭扁華張之起迨茲厥後仁賢間出歲且數千方逾萬卷專車之不受廣廈之不容然而載祀綿遠簡編虧替所詳者雖廣所略者或深討簡則功倍力煩

取捨則論甘忌苦永言筆削未暇尸之余幼多疾病長好醫術遭逢有道遂躡亨衢七登南宮兩拜東掖便繁臺閣二十餘載久知弘文館圖籍方書等繇是覩奧升堂皆探其秘要以婚姻之故貶守房陵量移大寧郡提攜江上冒犯蒸暑自南徂北既僻且陋染瘴嬰痾十有六七死生契闊不可問天賴有經方僅得存者神功妙用固難稱述遂發憤刊削庶幾一隅凡古方纂得五六十家新撰者向數千百卷皆研其總領覈其指歸近代釋僧深崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇等十數家皆有編錄並行於代美則美矣而未盡善何者各擅風流遞相矛盾或篇目重雜或商較繁蕪今並味精英鈐其要妙俾夜作晝經之營之捐眾賢之砂礫掇羣才之翠羽皆出入再三伏念旬歲上自炎昊迄於聖唐括囊遺闕稽考隱秘不愧盡心焉客有見余此方曰嘻博哉學乃至于此邪余答之曰吾所好者壽也豈進乎學哉至于遁天倍情懸解先覺吾常聞之矣投藥治疾庶幾有瘳乎又謂余曰稟生受形咸有定分藥石其如命何吾甚非之請論其目夫喜怒不節飢飽失常嗜慾攻中寒溫傷外如此之患豈由天乎夫為人臣為人子自家刑國由近兼遠何談之容易哉則聖人不合啟金縢賢者曷為條玉版斯言之玷竊為吾子羞之客曰唯唯嗚呼齊梁之間不明醫術者不得為孝子曾閔之行宜其用心若不能精究病源深探方論雖百醫守疾眾藥聚門適足多疑而不能一愈之也 主上尊賢重道養壽祈年故張王李等數先生繼入皆欽風請益貴而遵之故鴻寶金匱青囊綠帙往往而有則知日月所照者遠聖人所感者深至於嗇神養和休老補病者可得聞見也余敢採而錄之則古所未有今並繕緝而能事畢矣若乃分天地至數別陰陽至候氣有餘則和其經渠以安之志不足則補其復溜以養之溶溶液液調上調下吾聞其語矣未遇其人也不誣方將請俟來哲其方凡四十卷名曰外臺秘要方非敢傳之都邑且欲施於後賢如或詢謀亦所不隱是歲天寶十一載歲在執徐月之哉生明者也

唐銀青光祿大夫持節鄴郡諸軍事兼守刺史上柱國清源縣開國伯王燾撰

凡例

一外臺刻本宋版已滅而明程敬通再刊焉其功偉矣惜其不得宋本而以謄本刻之訛繆頗多幾誤後世今此刻直翻程本不敢妄改間有可疑者則揭之於上以發之其他如春作舂搏作摶柴胡作胡柴牡蠣作杜礪灸炙相溷密蜜互訛之類錯誤分明無可疑者則直改之不必揭之

一祕府宋本者希世舊物望君奉　旨校讎深可貴重謹錄之以表舊文望君卓立慷慨在鞅掌之間而勉爲此舉不啻吾徒荷卵翼之恩抑亦此書之天幸也哉但宋本頗有殘缺不能悉徵可謂千載遺憾也

一引用諸書各以本書對之文異意殊者具舉之文雖異而意不相戾者則舍之所恨見行本書亡幾加之肘後病源千金及翼等書脫誤尤多不足全據特取其中意義的確足徵者耳

一宋本雖間有可疑者而無本書可攷則錄之存舊之義也程本與本書同而宋本獨異者則舍之

一文中似有脫誤而無本書可攷偶有他書足證者則錄之以備參考

一方劑分兩諸書不同此只錄與本書異者其餘則記藥品異同而已

一方本出於仲景者雖引他書而必據仲景之書以辨異同以其爲醫家模範也

一書例當下格而平書當別揭而連書小書大書前後異法篇題卷尾漏脫數字之類皆照例從宜庶乎其爲善本也

一注文除自注及林注外皆程所附益非宋本之舊也不必一一識別

一程不知宋本有注解而私爲按者今皆削之而直揭宋本

一程氏標注疎繆頗多竊舉一二以俟君子訂之且文字似間有脫誤以非本文所與故置而不論也

一仲景之書一者傷寒論而已矣判爲要略者蓋自王叔和始王燾所見者亦止一書故其所引要略方通稱以爲傷寒論今記其異同以要略者欲便檢考也

一燾勤於集方而識則未也故其所取臟腑陰陽補益服餌禁咒炮炙等說與長沙氏之旨異者亦不少
矣讀者宜辨識焉

尚德按目錄差誤各就本卷辨之但有異同者特書于此

尚德按咳本卷作欬
尚德按翳本卷作瞖

唐王燾先生外臺秘要方目錄

卷三天行二十一門

卷四温病及黄疸二十門

大腸虛寒方三首　皮虛實方二首
上氣方九首　卒上氣方六首
久上氣方四首　上氣胸滿方二首
上氣欬身面腫滿方四首　上氣喉中水雞鳴方一十二首
因食飲水上氣方四首　卒短氣方四首
上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首　欬嗽上氣方八首
欬逆上氣嘔吐方四首　上氣欬嗽多唾方三首
上氣欬嗽方一首　久欬嗽上氣方三首
欬逆上氣方五首　雜療上氣欬嗽方四首

卷十一 消渴消中十八門

消渴方一十七首　近效極要消渴方二首
近效極要熱中小便多漸瘦方四首　渴利虛經脈澀成癰膿方一十一首
消渴口乾燥方三首　消中消渴腎消方八首
睡中尿牀不自覺方六首　渴後小便多恐生諸瘡方二首
渴後恐成水病方三首　虛勞小便白濁如脂方四首
强中生諸病方六首　消渴不宜鍼灸方一十首
卒消渴小便多太數方八首　近效祠部李郎中消渴方二首
將息禁忌論一首　飲魚肉等一十五件
飲菜等二十二件　飲米豆等九件 茶酒附

卷十二 癖及痃氣積聚癥瘕胸痺奔㹠三十八門

卷十四中風上二十一門

尚德按萎本卷作痿

卷十七虛勞下二十九門

尚德按四本卷作三

尚德按赤日本卷作目赤

卷二十一 眼疾二十四門

尚德按三本卷作二

尚德按一十首本卷作九首

尚德按五本卷作一

尚德按七本卷作八

尚德按突本卷作凸

卷二十六 痔病陰病九蟲等三十五門

尚德按一數當作二

卷二十八 中惡蠱注自縊暍死一十八門

尚德按三本卷作二

尚德按一首本卷作二首

卷二十九 墜墮金瘡等四十七門

尚德按四本卷作五

尚德按二本卷作三

尚德按七本卷作八

尚德按二本卷作三

尚德按七本卷作八

尚德按吃力伽丸方以下十六條即是古今諸家丸方門中之小目不宜與諸門並

列疑當下一字下散膏煎酒方皆倣此

尚德按七宣五補丸本卷作五補七宣丸

尚德按一首本卷作二首

尚德按繪本卷作鱠

尚德按悅字上本卷有光字

尚德按歷本卷作曆

尚德按門本卷作首

尚德按乳母本卷作產乳

尚德按亭疑當作葶

尚德按軫本卷作胗

尚德按本卷首有乳石論序

尚德按本卷同列以下別揭為一門州字下有孟字

尚德按三本卷作二

尚德按五本卷作七

尚德按三本卷作四


尚德按三本卷作二

尚德按本卷及字下有身字五作四

尚德按蠚本卷作囓

尚德按今
有方七首

唐王燾先生外臺秘要方卷一目錄傷寒上一十二門



尚德按此文王叔和傷寒例首引之蓋是一書未詳誰何氏所作也又按周密傷寒例作固密通按傷寒論大冷作大涼

唐王燾先生外臺秘要方卷一

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進
中憲大夫徽州府知府當湖王井陸錫明校閱
新安後學程衍道敬通父訂梓

諸論傷寒八家合一十六首

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凜冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也（仲景病源小品千金同）

王叔和曰傷寒之病逐日淺深以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫又不知次第而治之則不中病皆以臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方有神驗者擬防世急也又土地高下寒溫不同物性剛柔餐居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜須兩審也（小品千金同）

又曰夫表和裏病（一作陽盛陰虛）下之而愈汗之則死裏和表病（一作陽虛陰盛）汗之而愈下之則死夫如是則神丹不可以誤發（神丹丸在此卷崔氏部中六味者是也）甘遂何可以妄攻（甘遂者水導散也在第三卷天行狂語部中甘遂等二味者是也出千金方）表裏之治相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽表和則斃（桂枝湯在此卷仲景日數部中桂枝等五味者是也）承氣入胃裏平則亡（承氣湯在此卷仲景日數部中三味者是也）此表裏虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹為治乃誤使病者隕沒自謂其分至令冤魂塞於冥路死尸盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟（千金同）

五苓千金作豬苓又按千金無當者二字

尚德按障千金作瘴注文亦當從之

又凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而服之且解其外又除其內言巧似是於理實違安危之變豈可詭哉夫病發熱而惡寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者可攻其外發於陰者宜溫其內發表以桂枝溫裏宜四逆（四逆湯在第二卷傷寒不得眠部中三味者是也　通按第二卷傷寒不得眠部並無四逆湯三味方惟小便不利部內有四逆散加減法）

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸即愈若不解者至二日在膚可法鍼服解肌散發汗汗出即愈若不解者至三日在肌復發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆丸微吐則愈若更困藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈視病尚未醒醒者復一法鍼之（藜蘆丸近用損人不錄　瓜蒂散在卷末雜療中范汪方二味者是也）五日在腹六日入胃入胃則可下也若熱毒在胃外未入於胃而先下之者其熱乘虛便入胃則爛胃也然熱入胃病要當須復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有強弱病有難易功效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣（士弱氏曰藜蘆丸見第五卷許仁則療瘧云魯用釋深師一方大效三味者近似）

若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以五苓散一方寸匕水和服之（五苓散仲景云豬苓散是也在第二卷傷寒中風部中千金翼方五味者是也）當以新汲井水強飲一升許若一升半可至二升益佳令以指刺喉中吐之病隨手愈不即吐者此病輩多不善勿強與水水停即結心下也當更以餘藥吐之皆令相主當者不爾即危若此病不急以豬苓散吐解之者其死殆速耳亦可先吐去毒物及法鍼之尤佳

又云春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒宜服神丹丸亦可摩膏火灸（膏在雜療中黃膏四味范汪方是也）若末春夏月初秋凡此熱月不宜火灸又不宜厚覆宜服六物青散（青散在雜療中范汪方六味者是也）若崔文行度障散（度障散在雜療中范汪方四味者是也）赤散（赤散在雜療中范汪方七味者是也本出華佗）雪煎亦善（雪煎在雜療中古今錄驗方三味者是也）若無丸散及煎但單煮柴胡數兩傷寒時行並可服也不但一也至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈朝夕駃者

尚德按此條疑當與上文相合為一條

通按蒸濕二字千金作熱溫文理方順通按千金無黃帝岐伯問答似安

尚德按千金諸病發熱以下論直與前條接無上文黃帝岐伯問答及下文如之何岐伯答曰七字宜發汗下有溫粉粉之勿令遇風八字大下利下有則不

為實癖也朝平夕駛者非癖也轉下湯為可早與但當少與勿令下多耳少與當數其間

病有虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實也不可下如此內外皆不可攻而師強攻之必遂損竭多死矣諸虛煩但當行竹葉湯竹葉湯在第三卷天行虛煩部中出文仲方是也若嘔者與橘皮湯一劑不愈者可重與也橘皮湯在第二卷傷寒嘔噦部中四味者是也出於深師方此法官泰數用甚效

傷寒後虛煩亦宜服此湯仲景千金方同

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何答曰醫經云連發汗汗不出者死吾思可蒸之如蒸中風法蒸濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云魯有人作事疲極汗出卧單簟中冷得病但若寒踡諸醫與丸散湯四日之內凡八發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難使汗出者非但病使其然蒸之無不汗出也小品千金同蒸法在此卷崔氏日數部中阮河南法又有桃葉湯熏其法在第三卷天行部中文仲方支太素法是

范汪論黃帝問於岐伯曰人傷於寒而得病何以反更為熱岐伯曰極陰變陽寒盛則生熱熱盛則生寒諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗當發汗而其人適失血及大下利如之何岐伯答曰數少與桂枝湯使體潤漐漐汗纔出連日如此自當解也千金同

九卷云黃帝曰傷寒熱病死候有九太素云不可刺者九一曰汗不出大灌發者死太素云汗不出大灌發赤噦者死通按靈樞熱病論中大顴發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死甚一作黃三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痓者死熱病痓者腰反折瘈瘲齒噤齘也熱病七八日脈微小病者便血口中乾一日半而死熱病七八日脈不躁不數後三日中有汗三日不汗四日死熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生甲乙太素同士弱氏曰灌發灌驟也清也先不出汗從則若灌瀝之驟至而淋漓浸漬亡陽也

通按熱字千金作勢更安

通按時字千金作初源字作療或即後條痼疾二字

通按勒字宜是勅千

小品論曰古今相傳稱傷寒為難療之病天行溫疫是毒病之氣而論療者不別傷寒與天行溫疫為異氣耳云傷寒是雅士之辭云天行溫疫是田舍間號耳不說病之異同也考之眾經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述其要焉出第十卷中千金同

千金論曰人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者則天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解療皆云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯食競進折其毒熱自然而差必不可令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今博採羣經以為上下兩卷廣設備擬好養生者可得詳焉

又夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明矣當須消息病候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不可吐虛細不可下又夏亦不可下此醫之大禁也文仲同

又脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云時覺視病已積日其病源結成非復發汗解肌所除當診其脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第為固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜臥失覆寒濕所中并時有疾疫賊風之氣而相染易為惡邪所中也至於人自飲食生冷過多腹藏不消轉動稍難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也

又凡人有少病若似不如平常則須早道若隱忍不療冀望自差須臾之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若天行不和當自戒勒若有小不和則須救療尋其邪由及在腠理以時早療鮮有不愈者患人忍之

金作謹更明顔

尚德按能字上千金有言字

通按夾字一作挾

通按傷寒本文無不滿二字 尚德按此以下三條

數日乃說邪氣入藏則難可制此雖和緩亦無能為也癰疽疔腫尤為甚急此自養之至要也

又凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須療之也

又凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更與人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之勿令極意也能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦者不可與之飲而忽然汗出者已愈也人得病能飲水者欲愈也 出第九卷中

經心錄論曰傷寒病錯療禍及如反覆手耳故諺云有病不治自得中醫者論此疾也其病有相類者傷寒熱病風溫濕病陰毒陽毒熱毒溫疫天行節氣死生不同形候亦別宜審詳也 出第二卷中

論傷寒日數病源并方二十一首

素問黃帝曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日間其愈皆以十日以上者何也岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死帝曰願聞其狀岐伯曰一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肌肉其脈夾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得臥三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡于耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣

帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日可泄而已

又帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病形何如岐伯曰兩感於寒病者病一日則巨陽與少陰俱病則

疑當與上文相合為一條　通按譫字一作讝

通按小腸二字當作膀胱蓋小腸乃手太陽經也　通按肉字疑作肌　尚德按傷寒論甘草三兩

尚德按傷寒論甘草二兩芒硝半斤

頭痛口乾煩滿而渴也二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入不知人則六日而死

帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死（出第九卷中甲乙太素同）

病源傷寒一日太陽受病太陽者小腸之經也為三陽之首故先受病其脈絡于腰脊主於頭項故得病一日而頭項背髆腰脊痛也（尚德按小腸病源作膀胱）

又傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脈絡鼻入目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈（出第七卷中）

仲景傷寒論傷寒一二日心中悸而煩小建中湯主之方

桂心（三兩）　甘草（三兩炙）　生薑（三兩）　大棗（十二枚擘）　膠飴（一升）　芍藥（六兩）

右六味切以水七升先煮五味取三升去滓內飴更上火微煮令消解溫服一升日三服如嘔家不可服建中湯以甜故也忌海藻菘菜生葱（千金翼同出第三卷中張仲景傷寒論傷寒一二日內麻黃湯主之此云小建中湯非也此方但治心中悸而煩）

病源傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脈循於脇上於頭耳故得病三日胸脇痛而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故皆可汗而解（出第七卷中）

仲景傷寒論療太陽病三日發其汗病不解蒸蒸發熱者屬調胃承氣湯方

甘草（三兩炙）　芒硝（半升）　大黃（四兩）

右三味切以水三升煮二物取一升去滓內芒硝更煮微沸溫溫頓服以調胃承氣則愈忌海藻菘菜（經心錄同出第十卷中張仲景傷寒論三日亦可服麻黃湯此云調胃承氣湯非也此方但治三日發汗不解蒸蒸發熱者）

病源傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也為三陰之首是知三日以前陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脈絡於脾主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胸膈也故可吐而愈

又傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脈貫腎絡肺繫於舌故得病五日口燥舌乾渴而引飲也其

尚德按傷寒論名柴胡桂枝乾薑湯主治亦小異

尚德按胸病源作胃

尚德按熱字下玉函有未可二字

病在腹故可下而愈矣（並出第七卷中）

仲景傷寒論傷寒四五日身熱惡風頸項强脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之方 柴胡（半斤） 栝蔞根（四兩） 桂心（三兩） 黄芩（三兩） 牡蠣（三兩） 甘草（二兩炙） 乾薑（三兩） 右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服初服微煩溫覆汗出者便愈也忌生葱海藻菘菜（范汪同出第三卷中 仲景傷寒論名柴胡薑桂也合用柴胡人參甘草黄芩半夏生薑大棗七味小柴胡湯是也玉函千金翼同）

病源傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胸故可下而愈

又傷寒七日太陽病衰頭痛少愈傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳盡故也今七日以後病反甚不除者欲為再經病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也（並出第七卷中）

仲景傷寒論療傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其人小便反清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄血宜桂枝湯方（士弱氏曰藥非衄後用乃當汗時用則不衄矣先未汗故衄耳）

桂枝湯方 桂枝（三兩） 芍藥（三兩） 甘草（二兩炙） 生薑（三兩） 大棗（十二枚擘） 右五味切以水七升煮取三升去滓溫服一升須臾啜稀粥一升助藥力覆取微汗忌生葱海藻菘菜（集驗備急文仲范汪同 仲景傷寒論此方六七日病在表者可服之）

又傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在故可與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解

病源傷寒八日陽明病衰身熱少愈傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病證猶存也

又傷寒九日少陽病衰耳聾微聞傷寒九日以上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已畢又重感於寒故日數多而病候改變（出第七卷中）

尚德按傷寒論無下之二字

尚德按傷寒論甘草二兩生薑三兩

尚德按傷寒論無陳字

尚德按傷寒論半夏半升大棗十二枚

通按傷寒本文作已

仲景傷寒論療傷寒八九日風濕相搏身體疼痛而煩不能自轉側不嘔不渴下之脈浮虛而濇者屬桂枝附子湯若大便鞭小便自利者附子白术湯

桂枝附子湯方　桂心(四兩)附子(三枚炮去皮)生薑(三兩)甘草(二兩炙)大棗(十二枚擘)　右五味切以水六升煮取二升去滓温分三服忌生葱猪肉海藻菘菜

附子白术湯方　白术(四兩)大棗(十二枚)甘草(一兩炙)生薑(二兩)附子(三枚炮去皮四破)　右五味切以水六升煮取二升去滓温分三服初一服其人身如痺半日許復服之都盡其人如冒狀者勿怪此以附子术併走皮中逐水氣未除故使人如冒狀也本云附子一枚今加之二枚名附子湯忌葱猪肉菘菜海藻桃李雀肉等(千金翼同出第十一卷中　張仲景論法當加桂枝四兩此本一方二法以大便鞕小便自利故去桂也以大便不鞕小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及産婦宜減之此二方但治風濕非治傷寒也)

病源傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣(出第七卷中素問太素甲乙並同)

仲景傷寒論療吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘但發熱讝語者(讝疾而寤寐自語也)屬大承氣湯方　大黄(四兩去皮)陳枳實(五枚炙)芒硝(三合)厚朴(半斤)　右四味切以水一斗先煮二物取五升去滓内大黄煮取二升去滓内芒硝煮一二沸分為兩服初一服便得利者止後服不必盡劑(千金翼方并同出第五卷中)

又太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急(一云嘔止小安)鬱鬱微煩者為未解也可與大柴胡湯下之即愈方　柴胡(半斤)黄芩　芍藥(各三兩)半夏(半斤水洗)大棗(十二枚擘)生薑(五兩)枳實(四枚炙)　右七味切以水一斗二升煮至六升去滓更煎取三升温服一升日三服一方加大黄二兩今不加大黄恐不名為大柴胡湯也忌羊肉餳菜主天行(千金翼附後同)

又傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱熱畢而微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫

而微利

尚德按細注引玉函而小變其文遂失其旨

以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒硝湯主之方　柴胡（二兩十六銖）黃芩　人參　甘草（炙）生薑（各一兩）半夏（五枚）大棗（四枚擘）芒硝（二合）　右八味切以水四升煮七味取二升去滓下芒硝更上火煎一二沸分為兩服未解更作忌海藻菘菜羊肉餳等（出玉函經一方芒硝三合桑螵蛸五個大黃四分煮取一升半溫服五合微下愈本云柴胡湯再服以解其外取愈一方外加芒硝大黃桑螵蛸是也）

肘後方七首

肘後療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療者若初覺頭痛肉熱脈洪起一二日便作此葱豉湯方　葱白（一虎口）豉（一升綿裹）　右二味以水三升煮取一升頓服取汗若汗不出更作加葛根三兩一方更加升麻三兩水五升煮取二升分溫再服徐徐服亦得必得汗即差若不得汗更作加麻黃三兩去節服取汗出為效（文仲同）

又方　葱白（一握切）米（三合）豉（一升）　右三味以水一斗煮米少時下豉後內葱白令大熟取三升分溫三服則出汗

又方　豉（一升綿裹）　右一味以童子小便三升煮取二升分溫再服汗出為効集驗方加葱白一升切云神良（支太醫文仲備急同）

又方　葛根（四兩切）　右一味以水一斗煮取三升內豉一升更煮取一升半分溫再服取汗為差又方擣生葛根汁一二升服亦佳

又療傷寒汗出不歇已三四日胸中惡欲令吐者方　豉（三升綿裹）鹽（一兩）　右二味以水七升煮取二升半去滓內蜜一升又煮三沸頓服一升安臥當吐如不吐更服一升取吐為效

又方　苦參（三分）甘草（一分炙）瓜蒂　赤小豆（各二七枚）　右四味切以水一升煮取半升一服之當吐吐不止者作葱豉粥解之必息忌海藻菘菜

又方　苦參　黃芩（各二兩）生地黃（半斤）　右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忌蕪荑

深師方四首

深師療傷寒一日至三日應汗者作此湯方　葛根半斤　烏梅十四枚　葱白一握　豉一升綿裹　右四味切以水九升煮取三升分為三服初一服便厚覆取汗汗出粉之

又麻黃解肌湯療傷寒三四日煩疼不解者方　麻黃三兩去節　甘草一兩炙　杏仁七十枚去皮尖熬　桂心二兩　右四味切以水九升先煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥合煮取二升半絞去滓分服八合以汗出為度忌海藻菘菜生葱本仲景麻黃湯千金翼並同

又黃芩湯療傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利胸脇痞滿微熱而煩方　黃芩　桂心各三兩　茯苓四兩　前胡半斤　半夏半升洗　右五味切以水一斗二升煮取六升分為六服日三服夜三服間食生薑粥投取小便利為差忌羊肉餳生葱酢物

又石膏湯療傷寒病已八九日三焦熱其脈滑數昏憒身體壯熱沉重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沉重拘攣由表未解今直用解毒湯則攣急不差直用汗藥則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救其內有所增加以解其外故名石膏湯方　石膏　黃連　黃柏　黃芩各二兩　香豉一升綿裹　梔子十枚擘　麻黃三兩去節　右七味切以水一斗煮取三升分為三服一日併服出汗初服一劑小汗其後更合一劑分兩日服常令微汗出拘攣煩憒即差得數行利心開令語毒折也忌猪肉冷水出第十四卷中

小品方四首

小品詔書發汗白薇散療傷寒二日不解方　白薇二兩　麻黃七分去節　杏仁去皮尖熬　貝母各三分　右四味擣散酒服方寸匕厚覆卧汗出愈古今錄驗千金同

又雞子湯療發汗後二三日不解頭痛肉熱方　麻黃一兩去節　甘草一分炙　右二味切以水二升加雞子白令置水內合和令勻內藥復攪令和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之蓋覆汗出粉傳之有效忌海藻菘菜古今錄驗備急同張文仲療天行

尚德按傷寒論升麻五分天門冬以下八味各一分

又葛根湯療傷寒三四日不差身體熱毒方　葛根(八兩)　生薑(三兩)　龍膽　大青(各半兩)　桂心　甘草(炙)　麻黃(去節各二兩)　萎蕤(一兩)　芍藥　黃芩(各二兩)　石膏(碎)　升麻(各一兩)　右十二味切以水一斗先煮葛根麻黃取八升掠去沫後內餘藥煮取三升分三服日二夜一忌海藻菘菜生葱(千金同名葛根龍膽湯)

又療傷寒六七日其人大下寸脈沉遲手足厥逆下部脈不至咽喉痛不利吐膿血泄利不止者麻黃升麻湯方　麻黃(二兩半去節)　升麻(三分)　當歸(五分)　知母　萎蕤(一作菖蒲)　黃芩(各三分)　麥門冬(去心一作天門冬)　桂心　芍藥　乾薑　石膏(碎)　甘草(炙)　茯苓　白朮(各一兩)　右十四味切以水一斗先煮麻黃減二升掠去上沫內諸藥煮取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令盡汗出便愈忌海藻菘菜生葱醋桃李雀肉等(並出第六卷中此張仲景傷寒論方通按千金作麻黃知母萎蕤黃芩各三兩餘十味作各二兩為累耳用此方者當以傷寒論為正)

集驗方五首

集驗療傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛始得一二日者方　真丹砂(一兩末)　右一味以水一斗煮之取一升頓服之覆取汗忌生冷物(千金同)

又療疫氣傷寒三日以後不解者方　好豉(一升綿裹)　葱白(切一升)　右二味童子小便五升煮取二升分再服覆取汗神效(千金同)

又療傷寒五六日斑出以後湯方　猪膽(三合)　雞子(一枚)　苦酒(三合)　右三物合和煎令三沸強人盡服之羸人煎六七沸分為兩服取汗出為効(文仲備急千金同)

又療傷寒七八日不解默默煩悶腹中有乾糞譫語大柴胡湯方　柴胡　半夏(湯洗各八兩)　生薑(四兩)　知母　芍藥　大黃　萎蕤(各二兩)　甘草(炙)　一方加枳實(四兩)　黃芩(二兩)　右十味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳(范汪加人參三兩餘並同千金用芍藥不用枳實)

又療傷寒熱病十日以上發汗不解及吐下後諸熱不除及下利不止斑出方　大青(四兩)　甘草(二兩炙)　阿膠(炙珠二兩)　豉(一升綿裹)　右四味切以水八升煮二味取三升半去滓內豉煮三沸去滓乃內膠令溶分溫三服

尚德按莽草千金作甘草莽草宜摩則疑當以外臺為正

尚德按傷寒論云大承氣湯下同

尚德按傷寒論云大承氣湯主之

又按少與承氣湯傷寒論作與小承氣湯

又按傷寒論云大承氣湯

又按傷寒論者字下有與水二字堅作鞕下有而少也三字

欲盡更作當使有餘渴者當飲但除熱止吐下無毒忌海藻菘菜（附後深師千金同出第二卷中）

千金方六首（合一法）一十

千金治傷寒頭痛項強四肢煩疼青膏方　當歸　芎藭　吳茱萸　附子　烏頭　莽草　蜀椒（三兩）　白芷（三兩）　右八味切以醇苦酒漬再宿以猪脂四斤緩火煎候白芷色黃絞去滓以煖酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳忌猪肉

又少陰病得病二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

又少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

又陽明證其人善忘必有蓄血所以然者本有久瘀血故令善忘雖大便堅反易色必黑宜抵當湯下之

又傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此為有血不可餘藥宜抵當丸

又太陽病身黃脈沉結少腹堅小便不利者此為無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜抵當湯下之

又陽明病脈遲雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此為大便已堅宜承氣湯主之若汗多而微發熱惡寒為外未解宜桂枝湯其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不大便可少與承氣湯微和其胃氣勿令致大下

又陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅者勿與之若不大便六七日恐胃中有燥糞欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣者為有燥糞乃可攻之若不轉失氣者此為但頭堅後溏不可攻之攻之必脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必腹堅與小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻之

夫實則譫語虛則鄭聲（鄭聲重語也）直視譫語喘滿者死若下利者亦死

又傷寒四五日脈沉喘滿沉為在裏而反發汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語

承氣湯方

枳實（五枚炙陳者）　大黃（四兩）　芒硝（三合）　厚朴（半斤）

右四味切以水一斗先煮二味取五升內大黃更煮

尚德按傷寒論名大承氣湯無枳實用陳說

尚德按傷寒論蝱蟲二十五個又按千金蜜和合

尚德按千金翼茯苓芍藥各三兩傷寒論同

尚德按千金翼日再服傷寒論同

尚德按千金翼甘草二兩傷寒論同

取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服也

小承氣湯方　大黃四兩　厚朴二兩炙　枳實大者三枚炙　右三味切以水四升煮取一升二合去滓分溫再服若一服得利譫語止勿服之也

又抵當丸方　水蛭二十枚熬　桃仁二十枚去皮尖雙仁　蝱蟲二十枚去足翅熬　大黃三兩又按超疑當作翅篇中作超者並當做此　右四味末下篩合分為四丸以水一升煮一丸取七合頓服晬時當下血不下仍須服之取血下為效

又抵當湯方　水蛭三十枚熬　桃仁三十枚去皮　蝱蟲三十枚去足翅熬　大黃三兩　右四味切以水五升煮取三升分為三服不下更服

又療傷寒頭痛壯熱百節疼痛湯方　柴胡　芍藥　梔子仁　知母各四兩　香豉一升綿裹　石膏八兩碎　黃芩　大青　升麻　杏仁去雙仁皮尖各三兩　右十味切以水九升煮取二升七合分三服若熱盛者加大黃四兩並出第十卷中

千金翼方一十三首合二十三法

千金翼療少陰病一二日口中和其背惡寒者當灸之服附子湯方　大附子二枚炮　茯苓二兩　芍藥二兩　人參一兩　白朮四兩　右五味切以水八升煮取三升溫服一升日三服忌豬肉桃李雀肉酢

又療少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方

甘草湯方　甘草二兩　右一味切以水三升煮取一升半服七合日三服忌海藻菘菜

又桔梗湯方　大桔梗一兩　甘草三兩炙　右二味切以水三升煮取一升分兩服吐膿血差忌豬肉海藻菘菜

又療少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止而便膿血桃華湯方　赤石脂一斤一半全用綿裹一半篩末　乾薑一兩切　粳米一升　右三味以水七升煮取米熟去滓取七合內赤石脂末一方寸匕日三服傷寒論千金崔氏范汪同

尚德按千金翼半夏半升傷寒論同

尚德按傷寒論名梔子生薑豉湯

尚德按千金翼名大陷胸湯傷寒論同

又療少陰病得之二三日已上心中煩不得臥者黃連阿膠湯主之方 黃連四兩 黃芩一兩 雞子中黃二枚 芍藥二兩 阿膠三兩炙一云三片 右五味切以水六升先煮三味取二升去滓內阿膠煮烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服忌豬肉冷水 並出第十一卷中

又療傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或心下卒悸小便不利或不渴外有微熱或欬小柴胡湯方 柴胡八兩 半夏半斤洗 生薑 黃芩 人參 甘草炙各三兩 大棗十二枚擘 右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服但胸中煩而不嘔者去人參半夏加栝蔞實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半栝蔞根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下痞堅者去大棗加牡蠣六兩若心下卒悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂心三兩溫覆取微汗若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩忌羊肉餳海藻菘菜 崔氏深師同

又療傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此為未解梔子豉湯方 肥梔子十四枚擘 香豉四合綿裹 右二味以水四升先煮梔子取二升半去滓內豉更煮取一升半去滓溫分再服若一服得吐餘更勿服之若嘔者用後梔子加生薑湯 傷寒論備急同傷寒兼療不得眠

又梔子生薑湯方 肥梔子十四枚擘 香豉四合 生薑五兩切 右三味以水四升煮梔子生薑取二升半去滓內豉更煮取一升半去滓溫分再服若一服安即勿服 傷寒論同並療虛煩不得眠耳

又傷寒六七日結胸熱實其脈沉緊心下痛按之如石堅宜陷胸湯主之方 大黃六兩切 甘遂末一錢 芒硝一升 右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一二沸乃內甘遂小溫分再服得快利止後服

又傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

尚德按傷寒論石膏一斤千金翼甘草二兩用水一斗煮米熟湯成不云取六升傷寒論同白虎加人參湯亦倣此 尚德按此方以下仲景無此論 尚德按此方蓋據王叔傷寒論半夏二合半無黃芩止十一味 尚德按傷寒論用水一斗沫作汁 尚德按首字下疑脫一方附三字

又諸衂血家不可與白虎湯虛者亦不可與卒得之腹痛而利者但可溫之

又傷寒無大熱而口乾渴心煩其背微惡寒者白虎湯主之

又傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表証者白虎湯主之方　知母六兩　石膏一斤碎綿裹　甘草三兩炙　粳米六合　右四味切以水一斗二升煮取米熟去米內藥煮取六升去滓分六服日三服忌海藻菘菜千金傷寒論備急文仲崔氏范汪經心錄同諸家兼療天行之病

又白虎加人參湯方　石膏　粳米各一升　知母六兩　人參三兩　甘草二兩炙　右五味切以水一斗二升煮米熟內藥煮取六升去滓分服一升日三服此方立秋後立春前不可行白虎湯正二三月時尚冷亦不可與服與之則嘔利而腹痛忌海藻菘菜

又療傷寒八九日下之後胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯方　柴胡四兩　黃芩　生薑　龍骨　人參　牡蠣熬　鉛丹　桂心　茯苓各一兩半　半夏二合半湯洗　大棗六枚擘　大黃二兩　右十二味切以水八升煮取四升內大黃切如博棊子煮取二升去滓溫分再服忌羊肉餳生葱酢物

又陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身無有劑頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱在裏身必發黃宜服茵蔯湯方　茵蔯六兩　大肥梔子十四枚擘　大黃二兩　右三味切以水一斗二升先煮茵蔯減六升去滓內諸藥煮取三升分三服小便當利如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便出並出第九卷中

崔氏方一十五首

崔氏療傷寒始得一二日方　便可灸頂三壯又灸大椎三壯各加至五壯益良用之驗大椎平肩斜齊高大者是也仍不得侵項分取之則非也上接項骨下肩齊在椎骨節上是餘穴盡在節下凡灸刺不得失之毫釐今崔氏不定高下是以言之出黃帝鍼灸經

又療傷寒一日至三日可發汗度瘴散方　麻黃十分去節　桔梗　蜀椒汗　細辛　白朮　吳茱萸　防風各四

尚德按便字下千金有頭字 通按勑字作赤

分 烏頭炮 乾薑 桂心各五分 右十味擣篩為散溫酒服方寸匕溫覆取汗或數服得汗即止若得病一二日而輕者服此藥皆得汗解若得便重者頗不能解也然可以二大豆許著鼻孔中覺燥涕出一日可三四著必愈兼辟天行病忌猪肉生葱生菜桃李雀肉等

又療傷寒勑色惡寒發熱體疼發汗神丹丸方 人參五分 烏頭四分炮 半夏洗五分 茯苓五分 硃砂一分研 附子四分炮

右六味擣為末蜜和丸如大豆每服三丸生薑湯下發汗出令體中濈濈然如汗未出更以熱粥投之令汗出若汗少不解復如前法若得汗足不解當服桂枝湯此藥多毒飲水解其熱愈周護軍子期自說天行用之甚良故記之忌猪羊肉大酢生血等物删繁范汪同兼主天行

又療傷寒服度瘴散而不汗出者便作葱豉湯方 葱白十四莖 豉一升綿裹 右二味以水三升煮取一升頓服溫煖覆取汗出勝度瘴散也與前肘後方重

又療傷寒服葱豉湯不得汗可服葛根湯方 葱白十四莖 豉一升綿裹 葛根三兩切 右三味以水五升煮取二升分為再服溫覆取汗汗不出更服余時用此一服輙汗略不再服救數十人甚效

又療傷寒前軍府直吏周虎服葛根湯再服不得汗余更視之甚惡寒而拘急更思作麻黃湯以解之方

麻黃二兩去節 葛根三兩 葱白十四莖 豉一升綿裹 右四味切以水七升煮取二升半分三服虎再服快汗愈其疹與周虎相似者服之皆汗十餘人差

又療傷寒阮河南蒸法 薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃葉桑柏葉諸禾糠及麥麴皆可取用易得者牛馬糞亦可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此等物著火處令厚二三寸布席卧上溫覆用此發汗汗皆出若過熱當細審消息大熱者可重席汗出周身輙便止當以溫粉粉身勿令遇風

又療傷寒三五日疑有黃則宜服此油方 取生烏麻清油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟攪令相得作一服令盡

又小前胡湯療傷寒六七日不解寒熱往來胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛方胡洽云出張仲景

前胡八兩　半夏半升洗　生薑五兩　黃芩　人參　甘草各三兩炙　乾棗十二枚擘　右七味切以水一斗煮取三升分四服忌羊肉餳海藻菘菜古今錄驗同仲景方用柴胡不用前胡今詳此方治寒疝腹痛恐性涼耳合用仲景柴胡桂薑湯今崔氏用之未知其可也

又療傷寒或始得至七八日不大便或四五日後不大便或下後秘塞者承氣湯方

厚朴炙　大黃各三兩　枳實六片炙　右三味切以水五升煮取二升體強者服一升羸者服七合得下必效止范汪同

又若胃中有燥糞令人錯語正熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜服承氣湯通利而錯語者宜服下四味黃連除熱湯承氣湯舊用芒硝余以有毒故去之用之數年安穩得下良既服湯亦應外用生薑兌請作銳同下使必去燥糞若服湯兼兌而並不得下者可依本方加芒硝一兩

又薑兌法　削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

又方　以猪膽灌下部用亦立通張仲景傷寒論云猪膽和法醋少許灌穀道中

又前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得臥余思作此黃連解毒湯方

黃連三兩　黃芩　黃柏各二兩　梔子十四枚擘　右四味切以水六升煮取二升分二服一服目明再服進粥於此漸差余以療凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆佳傳語諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者此湯療五日中神效忌猪肉冷水

又大前胡湯療傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛內外有熱煩嘔不安方胡洽云出張仲景

前胡半斤　半夏半升洗　生薑五兩　枳實八片炙　芍藥四兩　黃芩三兩　乾棗十二枚擘　右七味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一服忌羊肉餳等物古今錄驗同張仲景用柴胡不用前胡本云加大黃二兩不加大黃恐不名大柴胡湯

又凡少陰病寒多表無熱但苦煩憒默默而極不欲見光有時腹痛其脈沉細而不喜渴經日不差舊用四順湯余怪其熱不甚用也若少陰病下利而體猶有熱者可服黃連龍骨湯若已十餘日而下利不止手足徹冷及無熱候者可服增損四順湯方黃連龍骨湯見第三卷天行中

甘草二兩炙　人參二兩　龍骨二兩　黃連　乾薑各二

（兩）附子（中形者一枚炮去黑皮）　右六味切以水六升煮取二升分再服不差復作甚良若下而腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩忌海藻菘菜猪肉冷水

又療少陰病二十日後下不止可服陟釐丸浩京方　陟釐（四兩不用鹹者）　當歸（四兩）　漢防已（三兩）　黃連（三兩）　紫石英（別擣末細研二兩）　豉（三升）　厚朴（二兩炙）　苦酒（五升）　右八味切以二升苦酒漬防已一宿出切炙之燥復內苦酒中盡止

又以三升苦酒漬豉一宿小蒸之研絞取汁擣下篩諸藥以酒豉汁和之丸如梧桐子大冷漿水服二十丸丸極燥乃可服之忌猪肉冷水（並出第一卷中）

張文仲方一十首

張文仲葛氏療傷寒及溫病頭痛壯熱脈盛始得一二日方　破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煮一升水令沸以雞子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆取汗（備急同）

又療傷寒二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方　柴胡（半斤）　人參　甘草（炙）　黃芩　生薑（各二兩）　半夏（五合洗）　大棗（十二枚擘）　右七味切以水一斗二升煮取三升分三服微覆取汗半日便差不差更服一劑忌羊肉餳海藻菘菜（備急范汪千金翼方重）

又療傷寒溫病等三日以上胸中滿陶氏云若傷寒溫病已三四日胸中惡欲令吐者服酒膽方　苦酒（半升）　猪膽（一枚）　右二味和盡服之吐則愈神驗支云去毒氣妙（胡洽集驗備急千金同）

又療傷寒近效方凡胸中惡痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者方　鹽末（一大匙）　右一味以生熟湯調下須臾則吐吐不快明旦更服甚良（備急同）

又瓜蒂散主傷寒胸中痞塞宜吐之方　瓜蒂　赤小豆（各一兩）　右二味擣散白湯服一錢匕取得吐去病差止（備急經心錄范汪同）

又療傷寒已四五日頭痛體痛肉熱如火病入腸胃宜利瀉之方　生麥門冬（一升去心）　生地黃（切一升）　知母（二兩）　生薑（五兩半）　芒硝（二兩半）　右五味以水八升煮取二升半內芒硝煎五沸分五服取利為度忌蕪荑（備急同）

尚德按此即傷寒論小承氣湯仲景方枳實三枚

尚德按太字下疑脫醫字

尚德按今有方七首

尚德按要略分兩與此不同

又療傷寒五日以上宜取下利陶氏云若汗出大便堅而譫語方　大黃(四兩)厚朴(二兩炙)枳實(四枚炙)　右三味以水四升煮取一升二合分兩服通者一服止(此是仲景方備急范汪同與前千金崔氏方重)

又療傷寒八九日不差名為敗傷寒諸藥不能消者方　鼈甲(炙)蜀升麻　前胡　烏梅　枳實(炙)犀角屑　黃芩(各二兩)甘草(一兩炙)生地黃(八合)　右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二服(出支臺太)忌海藻菘菜莧菜蕪荑(備急方同)

又若十餘日不大便者服承氣丸方　大黃　杏仁(去皮尖各二兩)枳實(一兩炙)芒硝(一合)　右四味擣下篩蜜和丸如彈子以生薑湯六七合研一丸服之須臾即通不通更服一丸取通為度(備急同)

又療晚發傷寒三月至年末為晚發方　生地黃(一斤打碎)梔子(二十枚擘)升麻(三兩)柴胡　石膏(各五兩)　右五味切以水八升煮取三升分五服頻頻服若不解更服若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升煮取三升分三服忌蕪荑(備急同並出第二卷中)

古今錄驗方八首

古今錄驗陽毒湯療傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見神鬼或吐血下利其脈浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛唾膿血五日可療至七日不可療也宜服升麻湯方　升麻(二分)當歸(二分)蜀椒(汗一分)雄黃(研)梔子　桂心(各一分)甘草(二分炙)鼈甲(大如手一片炙)　右八味切以水五升煮取二升半分三服如人行五里久再服溫覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服亦取得吐佳陰毒去雄黃忌海藻菘菜生葱莧菜(張仲景方無梔子桂心陰毒去雄黃蜀椒)

又陰毒湯療傷寒初病一二日便結成陰毒或服湯藥六七日以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛喉咽不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脈沉細緊數(一本無數字)仲景云此陰毒之候身如被打五六日可療至七日不可療宜服甘草湯方　甘草(炙)升麻　當歸(各二分)蜀椒(一分出汗)鼈甲(大如手一片炙)　右五味切以水五升煮取二升半分再服如人行五里頃復服溫覆當出汗汗出則

愈若不得汗則不解當重服令汗出忌海藻菘菜莧菜千金集驗備急文仲小品附後同並出第二卷中

又還魂丸療傷寒四五日及數年諸癖結堅心下飲食不消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃逆滿腸鳴兩脇裏急飛尸鬼注邪氣或為驚恐傷瘦背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有時風溫不能久住吐惡水方　巴豆去心皮熬　甘草炙　硃砂　芍藥各二兩　麥門冬二兩去心　右五味各擣下篩合和以蜜擣三千下丸如梧桐子大每服兩丸葱棗湯下小兒二歲以上服如麻子大二丸日二服忌海藻菘菜野猪肉蘆笋生血物出第三卷中

又麥奴丸療傷寒五六日以上不解熱在胸中口噤不能言唯欲飲水為敗傷寒醫所不療方　麻黃去節　大黃　芒硝　竈突中墨　黃芩各二分　麥奴　梁上塵　釜底墨各一分　右八味擣篩蜜和如彈丸以新汲水五合研一丸病者渴欲飲水但極飲冷水不節升數須臾當寒寒訖汗出則愈若日移五丈不汗依前法服一丸以微利止藥勢盡乃食當冷食以除藥勢一名黑奴丸小麥黑勃名為麥奴是也肘後胡洽小品刪繁張文仲深師范汪經心錄廣濟並同

又解肌湯療傷寒發熱身體疼痛方　葛根四兩　麻黃去節　茯苓各三兩　牡蠣二兩熬　右四味切以水八升煮取三升分三服徐徐服之得汗通則止忌酢物千金有生薑甘草

又調中湯療夏月及初秋忽有暴寒折於盛熱熱結四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下痢或血成水或赤帶下壯熱且悶脈微且數宜下之方　大黃　葛根　黃芩　芍藥　桔梗　茯苓　藁本　白朮　甘草炙各二兩　右九味以水九升煮取三升分三服服別相去二食久勿以食隔須取快下壯熱便歇其下亦止也凡秋夏早熱積日忽有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃為六腑之長最易得傷非忽暴寒傷之而下也虛冷人則不在壯熱但下痢或霍亂也少實人有服五石人喜壯熱其適與藥喫斷下則加熱喜悶而死矣亦有不止便作𤸇熱毒壯熱甚不歇則劇是以宜此調中湯下之和其胃氣其表熱者宜前胡大黃下之也忌海藻菘菜豬肉酢物桃李雀肉等

尚德按勑千金作赤

尚德按咽之千金作摩時尚德按皮疑當作度

尚德按千金云進溫粥一杯以發之

又療往來寒熱胸脅逆滿桃仁承氣湯方 大黃(四兩別漬下) 甘草(炙) 芒硝(湯成下) 桂心(各二兩) 桃仁(五十枚去皮尖碎)

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更煎一兩沸溫分三服忌海藻菘菜(太醫校尉史脫方附後傷寒論千金翼同)

(並出第二卷中)

雜療傷寒湯散丸方八首(並是論中所要者)

范汪療傷寒勑色頭痛頸強賊風走風黃膏方 大黃 附子 細辛 乾薑 蜀椒(去目) 桂心(各一兩) 巴豆(好者五十枚去皮)

右七味各切以淳苦酒漬藥一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒勑色發熱酒服如梧桐子許又以摩身數百遍兼療賊風絕良風走肌膚追風所在摩之已用有效(此趙泉方千金同) 忌野猪肉生葱生菜蘆笋

又療傷寒白膏摩體中手當千遍藥力方行并療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆療之先以鹽湯洗惡瘡布拭之著膏瘡腫上摩向火千遍日再自消方 天雄 烏頭(炮) 莽草 羊躑躅(各三兩) 右四味各切以苦酒三升漬一宿作東向露竈又作十二聚濕土各二升許成煎猪脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪為火令膏釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定頃上火煎如此十二過令土聚盡遍藥成絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚溫覆取汗咽痛含如棗核日三咽之不可近目(千金同忌猪肉等)

又崔文行解散療傷寒發熱者方(一名皮療散) 烏頭(一斤燒) 桔梗 細辛(各四兩) 白术(八兩) 右四味擣散皆令盡若中寒服一錢匕覆取汗若不覺復少增服之以知為度時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服忌生菜猪肉桃李雀肉等(千金同)

又六味青散療傷寒勑色惡寒者方(勑通作赤) 烏頭(炮) 桔梗 白术(各十五分) 附子(炮五分) 防風 細辛 右六味擣篩為散溫酒服錢五匕不知稍增服後食頃不汗出者飲薄薄粥一升以發之溫覆汗出濈濈可也勿令流離勿出手足也汗微出勿粉若汗大出不止溫粉粉之不得汗者當更服之得汗而不解當服神丹丸忌生菜猪肉桃李雀肉等(千金同)

尚德按千金杏仁三斗四升用水五石三斗煎得二斗四升

又服桂枝湯大汗出後脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一日再發者汗出便解屬桂枝二麻黄一湯主之方　桂心（一兩十七銖）　杏仁（十六枚去皮尖）　芍藥（一兩六銖）　麻黄（一十六銖去節）　生薑（一兩六銖切）　甘草（炙一兩二銖）　大棗（五枚擘）　右七味切以水五升先煮麻黄一兩沸掠去沫乃内諸藥煮得二升去滓温服一升日再本云桂枝湯二分麻黄湯一分合為二升分再服今合為一方忌海藻菘菜生葱（本張仲景傷寒論方集驗療天行）

又療傷寒及天行瓜蒂散吐方　赤小豆　瓜蒂（各一兩）　右二味擣作散温湯二合服一錢匕藥下便臥若吐便且急忍也候食頃不吐者取錢五匕散二合湯和服之便吐矣不吐復稍增以吐為度吐出青黄如菜汁者五升以上為佳若吐少病不除者明日如前法復服之可至再三不令人虛也藥力過時不吐服湯一升助藥力也吐出便可食無復餘毒若服藥過多者益飲冷水解之（與前張文仲方重）

又療傷寒熱病辟毒氣疫病七味赤散方　硃砂　烏頭（炮各二兩）　細辛　躑躅　乾薑　白术（各一兩）　栝蔞（一兩半）　右藥擣散服半錢匕用酒調服汗出解不解增至一錢匕除邪氣消疫癘忌桃李雀肉生菜猪肉生血等物（出第二十一卷中）

又療傷寒雪煎方　麻黄（十斤去節）　杏仁（四升去雙仁尖皮熬擣為膏）　大黄（一斤十三兩金色者各細剉）　右三味以雪水五石四斗清麻黄於東向竈釜中三宿入大黄攪調炊以桑薪煮至二石去滓復於釜中下杏仁膏煎至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎得二斗六升其藥已成可丸如彈子大有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒温服立汗出若不愈者復服一丸密封藥勿令泄氣也（此本出第三卷中千金同）

外臺秘要卷一終

